

Su procedimiento estará a cargo del Doctor _____

Dirección: _____

Fecha del procedimiento: _____ Hora de llegada: _____ AM/PM

Comentarios: _____

HalfLyte^{ly} & Bisacodyl tablets Bowel Prep K t

PEG-3350, sodium chloride, sodium bicarbonate
and potassium chloride for oral solution and
bisacodyl delayed-release tablets



El día antes del procedimiento:

NO coma ningún alimento ni beba leche.

Beba líquidos translúcidos solamente. Puede tomar cualquiera de los líquidos indicados a continuación, siempre que no sean de color ROJO ni VIOLETA:

- Jugos de fruta colados sin pulpa (manzana, uva blanca, limonada)
- Agua
- Caldo translúcido
- Café o té (sin leche ni crema artificial)
- Gatorade®
- Refrescos con o sin gas
- Gelatina sola (Jell-O®) (sin agregado de frutas ni otros ingredientes)
- Paletas heladas ("Popsicle®") (solamente azules, verdes, amarillas, naranjas o rosadas)
- Kool-Aid® (u otras bebidas con sabor frutal)

Debe hacer lo siguiente:



_____ AM/PM



_____ AM/PM



_____ AM/PM



Después de producirse el movimiento intestinal

PASO 1. TOME LOS DOS COMPRIMIDOS

- Tome los dos comprimidos de bisacodilo con agua.
- NO los mastique ni triture.
- No tome los comprimidos de bisacodilo dentro del plazo de 1 hora de haber tomado un antiácido.

PASO 2. MEZCLE LA SOLUCIÓN

- Si tomará...
 - HalfLyte ly Lemon-Lime (de lima-limón):* abra la botella.
 - HalfLyte ly con Flavor Packs (sobres de sa- rilizante):* abra 1 sobre de su elección y vierta el contenido en la botella de HalfLyte ly. Deseche los sobres que no haya usado. La solución se puede usar con o sin saborizante.
- Agregue agua hasta la línea marcada en la parte superior de la botella.
- Tape la botella y agite hasta que el polvo se disuelva.*
- La solución reconstituida será translúcida e incolora. Úsela dentro de las 48 horas siguientes. No se debe agregar ningún ingrediente adicional a la solución (a excepción de los sobres de saborizante incluidos).

PASO 3. ESPERE A QUE SE PRODUZCA MOVIMIENTO INTESTINAL

- Después del movimiento intestinal (generalmente al cabo de 1 a 6 horas), comience a beber la solución.
- Si al cabo de 6 horas aún no se ha producido ningún movimiento intestinal, comience igualmente a beber la solución.

PASO 4. BEBA TODA LA SOLUCIÓN

- Tome 1 vaso (8 oz) cada 10 minutos (aproximadamente 8 vasos). Es mejor tomar todo el vaso rápidamente de una vez en lugar de tomarlo en muchos sorbos.
- Es importante que tome TODA la solución. Esto le llevará aproximadamente 1 hora y media.

Nota:

- El kit de preparación intestinal con HalfLyte ly y comprimidos de bisacodilo es un lavado gastrointestinal indicado para limpiar el colon como preparación para una colonoscopia en adultos.
- Si tiene colitis ulcerosa grave o toma medicación, como un diurético, consulte al médico antes de usar este producto.
- Puede ocurrir hinchazón o distensión abdominal antes del primer movimiento intestinal. Si la distensión o el malestar abdominal continúan, deje de tomar la solución HalfLyte ly temporalmente o tome las porciones a intervalos más prolongados hasta que desaparezcan los síntomas.
- No tome ningún otro medicamento dentro del plazo de 1 hora de haber comenzado a beber la solución.
- No tome grandes cantidades de líquidos translúcidos después de tomar la solución HalfLyte ly hasta finalizada la colonoscopia.
- Si tiene preguntas sobre este producto, consulte al médico o profesional de la salud.

* Esta solución reconstituida se puede refrigerar.

Estos son algunos ejemplos de un día habitual antes del procedimiento:

	SI COMIENZA A LAS 12:00 (MEDIODÍA)	SI COMIENZA A LAS 2:00 PM	SI COMIENZA A LAS 4:00 PM
TOME 2 COMPRIMIDOS	12:00 (MEDIODÍA)	2:00 PM	4:00 PM
MEZCLE LA SOLUCIÓN	1:00 PM	3:00 PM	5:00 PM
ESPERE A QUE SE PRODUZCA MOVIMIENTO INTESTINAL	1:00 PM a 6:00 PM	3:00 PM a 8:00 PM	5:00 PM a 10:00 PM
DESPUÉS DE PRODUCIRSE EL MOVIMIENTO INTESTINAL	BEBA TODA LA SOLUCIÓN	BEBA TODA LA SOLUCIÓN	BEBA TODA LA SOLUCIÓN

Para obtener más información sobre este producto, llame al 1-800-874-6756 o visite nuestro sitio web en www.HalfLyte ly.com

Ofrecido como un servicio informativo de

BrainTree
LABORATORIES, INC